



ביחד אנחנו חזקים

יום הפומפה הבינלאומי

יותר מוקדם – יותר טוב

אבחון מוקדם הוא המפתח להשגת התוצאות הטובות ביותר מהטיפול הקיים כיום למחלת פומפה

היום, משך הזמן הממוצע מתחילת התסמינים עד לאבחון הוא 10 שנים

איך את/ה יכול לעזור ?

למד/י את הסימנים המוקדמים של מחלת פומפה

בדיקת דם פשוטה יכולה לאשר (או לשלול) מחלת פומפה

תסמיני מחלת הפומפה יכולים להופיע בצורות שונות

מחלת פומפה כל כך נדירה שרופאים לעתים מפספסים את הסימנים המוקדמים, וחולים נשארים ללא אבחון או עם אבחון מוטעה.

<u>תסמינים מוקדמים של מחלת הפומפה בצורתה המאוחרת (Late onset)*</u>	<u>תסמינים מוקדמים של מחלת פומפה בינקות *infantile onset</u>
<ul style="list-style-type: none">• קושי בהליכה או בטיפוס במדרגות• קושי בקימה מכיסא• קשיי נשימה (לפעמים באים לידי ביטוי ככאבי ראש בבקר, בחילות בבקר, או עייפות)• כאבי שרירים או חולשה• נפילות מרובות• עייפות אחרי מאמץ קל או בינוני <p>* התסמינים של הצורה המאוחרת יכולים להופיע בכל גיל. לא בהכרח כל התסמינים יופיעו</p>	<ul style="list-style-type: none">• לב מוגדל• קשיי אכילה• חולשת שרירים קיצונית - floppy baby• עיכוב בהתפתחות <p>* התסמינים לצורת הינקות של מחלת פומפה יכולים להופיע בשבועות הראשונים של החיים. לא בהכרח כל התסמינים יופיעו</p>

באם את/ה חושד/ת שזה מחלת פומפה, פנה אל הרופא ובקש להיבדק

על מנת ללמוד יותר אודות מחלת הפומפה, כולל איך להיבדק, ראה:
www.worldpompe.org



Together We Are Strong

International Pompe Day