



15. duben, 2016
Spolu jsme silní
Mezinárodní den Pompeho nemoci

ČÍM DŘÍVE – TÍM LÉPE

Včasná diagnóza Pompeho nemoci je klíčem k docílení nejlepších výsledků současné možné léčby

Průměrná doba k určení diagnózy činí deset let od prvotních příznaků.

JAK MŮŽETE POMOCI

Naučte se rozpoznat první varovné signály Pompeho choroby.

K určení (nebo vyloučení) Pompeho nemoci stačí jednoduchý krevní test.

Příznaky Pompeho nemoci se mohou projevit různě.

Pompeho nemoc je tak vzácná choroba, že lékaři často přehlédnou první příznaky a pacienti jsou špatně diagnostikováni, anebo nejsou diagnostikováni vůbec.

Symptomy Pompeho nemoci s nástupem v raném dětství *

- Zvětšené srdce
- Obtížný příjem potravy
- Hypotonie („Floppy Baby“)
- Záklon hlavy
- Vývoj kojence je pomalý

**Příznaky Pompeho nemoci s nástupem v raném dětství se mohou projevit už v prvních týdnech života. Ne všechny symptomy se musí objevit hned na začátku onemocnění.*

Symptomy Pompeho nemoci s pozdějším nástupem *

- Obtížné vstávání z dřepu, nejistá chůze do schodů
- Obtíže při vstávání ze židle
- Respirační obtíže, které se mohou projevit ranními bolestmi hlavy, ranní nevolnosti nebo malátnosti
- Svalová slabost nebo bolesti svalů
- Časté pády
- Rychlá únava i po lehké námaze

**Příznaky Pompeho nemoci s pozdějším nástupem se mohou objevit v jakémkoliv věku. Ne všechny symptomy se musí objevit hned na začátku onemocnění.*

Pokud máte podezření, že trpíte Pompeho nemocí, vyžádejte si test.

**DALŠÍ INFORMACE O POMPEHO NEMOCI VČETNĚ
TESTOVÁNÍ NAJDETE NA WWW.WORLDPOMPE.ORG**