



15 aprile 2016  
Together We Are Strong  
International Pompe Day

# PRIMA È... MEGLIO È!

Una diagnosi precoce della malattia di Pompe è fondamentale per ottenere i migliori risultati dalla terapia attualmente disponibile.

Oggi giorno, dalla comparsa dei primi sintomi alla diagnosi passano in media 10 anni.

## COSA SI PUÒ FARE

**Scopri quali sono i primi segni e sintomi della malattia di Pompe.**

Un semplice esame del sangue può essere utile a diagnosticare (o escludere) la malattia di Pompe.

**I sintomi della malattia di Pompe possono manifestarsi in modi diversi**

La malattia di Pompe è una malattia rara e spesso i primi segni non vengono riconosciuti dai medici, con conseguente ritardo nella diagnosi o diagnosi errata.

### Primi sintomi della Malattia di Pompe ad insorgenza infantile \*

- Ingrossamento del cuore
- Problemi ad alimentarsi
- Ipotonia muscolare
- Impossibilità di tenere il capo sollevato
- Mancato raggiungimento di determinate tappe nello sviluppo

*\* Possono presentarsi nelle prime settimane di vita. I sintomi non si manifestano necessariamente tutti da subito o contemporaneamente.*

### Primi sintomi della Malattia di Pompe ad insorgenza tardiva \*

- Difficoltà a camminare o salire le scale
- Difficoltà ad alzarsi dalla posizione seduta
- Difficoltà respiratorie (che si manifestano a volte con mal di testa, nausea al mattino, e sonnolenza durante il giorno)
- Dolore o debolezza muscolare
- Cadute frequenti

*\* Possono presentarsi a qualsiasi età. I sintomi non necessariamente si manifestano tutti da subito o contemporaneamente.*

***Richiedi un test ai primi sospetti di malattia di Pompe***

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA MALATTIA DI POMPE  
E SULLA DIAGNOSI VISITA IL SITO [www.worldpompe.org](http://www.worldpompe.org)**