



15 April 2016
SKUPAJ SMO MOČNEJŠI
Mednarodni dan Pompejeve bolezni

ČIM PREJ – TEM BOLJE

Zgodnje diagnosticiranje Pompejeve bolezni je ključ do najboljših učinkov razpoložljivega zdravljenja.

Še vedno povprečno traja deset let od prvih znakov bolezni do diagnoze.

KAKO POMAGATI

Prepoznajte zgodnje opozorilne znake Pompejeve bolezni.

Le preprost krvni test zadošča za diagnosticiranje (ali izločitev) Pompejeve

Simptomi Pompejeve bolezni se lahko kažejo na različne načine.

Pompejeva bolezen je tako redka, da zdravniki pogosto prezrejo prve znake, zato so pacienti napačno diagnosticirani ali pa sploh ne.

Zgodnji simptomi Pompejeve bolezni pri otrokih*

- povečano srce
- težave pri prehranjevanju
- "mlahav" dojenček (ne obvlada mišic)
- ne drži glave
- zaostanek v razvoju

**Simptomi Pompejeve bolezni pri otrocih se lahko pojavijo v prvih tednih življenja. Sprva se lahko pojavijo le nekateri.*

Zgodnji simptomi Pompejeve bolezni pri odraslih*

- težave pri hoji ali vzpenjanju po stopnicah
- težave pri vstajanju s stola
- težave z dihanjem (včasih opazne kot jutranji glavoboli, jutranja slabost ali dremavost)
- bolečine v mišicah ali oslabelost
- pogosti padci
- hitra utrujenost po lahki/zmerni telesni vadbi

**Simptomi Pompejeve bolezni pri odraslih se lahko pojavijo pri kateri koli starosti. Sprva se lahko pojavijo le nekateri.*

Pojdite na test, če sumite na Pompejevo bolezen.

Če se hočete poučiti o Pompejevi bolezni ali kako se testirati, pogledjte na: www.worldpompe.org