



15 April 2016
Together We Are Strong
International Pompe Day

JU TIDIGARE-DESTO BÄTTRE

Tidig diagnos är nyckeln till att uppnå bästa resultat av den behandling som idag finns tillgänglig.

Idag är genomsnittstiden 10 år från det att en patient får de första symptomen tills dess att diagnos ställs.

SÅ KAN DU HJÄLPA

Lär dig de tidiga varningssignalerna på Pompes sjukdom.

Ett enkelt blodprov kan bidra till diagnos av (eller utesluta) Pompes sjukdom.

Symptom från Pompes sjukdom kan vara många olika.

Pompes sjukdom är så ovanlig att läkare ofta missar tidiga tecken, vilket leder till att patienter får fel diagnos, eller ingen diagnos alls.

Tidigare symptom på barn-varianten av Pompes sjukdom *

- Förstorat hjärta
- Svårt med matning
- Slapphet / dålig muskelkontroll
- Ostabilt huvud
- Försenad utveckling

**Symptom vid barn-varianten kan visa sig första veckan i livet. Men alla symptom kanske inte märks från början.*

Tidiga symptom på vuxen-varianten av Pompes sjukdom *

- Svårigheter att gå i trappor
- Svårighet att resa sig ur stol
- Andningssvårigheter (ibland morgonhuvudvärk, illamående på morgonen eller trötthet)
- Muskelsmärkta eller svaghet
- Upprepade fall
- Blir trött snabbt efter normal träning

**Symptom vid vuxen-varianten kan visa sig i olika åldrar. Det är inte säkert att alla symptom visar sig..*

Om du misstänker Pompes sjukdom – begär ett test!

**FÖR MER INFORMATION OM POMPES SJUKDOM,
OCH HUR DU TESTAR DIG, BESÖK: www.worldpompe.org**